

Nous offrons deux types d'interruption de grossesse. Voici un tableau comparatif pour vous aider à choisir la méthode qui vous convient le mieux. Sachez qu'il est possible que vous ne soyez pas éligible à l'une ou l'autre des méthodes pour diverses raisons.

Caractéristiques	Avortement chirurgical	Avortement médical
Nombre de semaines de grossesse pour effectuer l'avortement au Centre de santé des femmes de la Mauricie (CSFM)	Entre la 5 ^{ème} et la 14 ^{ème} semaine de grossesse selon l'échographie.	Entre la 5 ^{ème} et la 9 ^{ème} semaine de grossesse selon l'échographie.
Lieu de l'avortement	Au CSFM	Au CSFM et à votre domicile
Nombre de rendez-vous requis	Minimum deux visites obligatoires. La 1 ^{ère} pour la rencontre préparatoire et une 2 ^{ème} pour l'intervention.	Minimum trois visites obligatoires. La 1 ^{ère} pour la rencontre préparatoire, la 2 ^{ème} pour la remise des comprimés et la 3 ^{ème} pour le rendez-vous de suivi confirmant l'avortement complet.
Technique de l'avortement	Dilatation, aspiration et curetage	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 comprimé de mifépristone pris au CSFM. ○ 4 comprimés de misoprostol pris à domicile 24 à 48 heures suivant la prise du mifépristone.
Temps nécessaire pour effectuer l'interruption de grossesse	L'intervention dure en moyenne dix minutes.	De 4 à 6 heures jusqu'à quelques jours après la prise du deuxième médicament (<i>misoprostol</i>).
Pourcentage de réussite	Très efficace (> 99%)	Très efficace (>95%)
Possibilité de douleurs abdominales	Douleurs légères à modérées pendant l'intervention.	Douleurs modérées à sévères pendant l'expulsion.
Méthodes offertes pour soulager la douleur	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sédation consciente induite par deux médicaments intraveineux. ○ Anesthésie locale du col de l'utérus. 	Analgésiques à prendre par voie orale à domicile.
Effets indésirables de la médication	Possibilité de nausées, vomissements, chute de pression artérielle, somnolence et difficulté respiratoire.	Possibilité de nausées, vomissements, diarrhées, fièvre, maux de tête et frissons.
Saignements	Certaines femmes n'ont aucun saignement, d'autres en ont des légers à modérés durant une période allant jusqu'à 3 semaines.	Oui, il y aura des saignements. Ils seront de modérés à sévères au début puis légers par la suite durant une période allant jusqu'à 2 semaines et parfois davantage.

Caractéristiques	Avortement chirurgical	Avortement médical
Complications possibles	Elles sont rares mais possibles incluant : allergie médicamenteuse, avortement incomplet, poursuite de la grossesse, infection de l'utérus, hémorragie, risque d'infertilité, décès.	
	Dépression respiratoire, perforation de l'utérus, hystérectomie totale ou partielle.	Embryotoxicité, rupture d'une grossesse ectopique non détectée, syndrome du choc toxique.
Accompagnement requis	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pour le retour à domicile. ○ Il est interdit de conduire durant 24h dû à la médication reçue. Vous serez considérée en facultés affaiblies. 	Il est fortement recommandé qu'une personne soit présente avec vous à la maison pour vous offrir du soutien en cas de besoin.
Jours de congé travail/école accordés	Le jour de l'intervention et les deux journées suivantes.	Le jour de la prise du <i>mifépristone</i> au CSFM, le jour de la prise du <i>misoprostol</i> à domicile et la journée suivante. Le jour de la rencontre de suivi.
Coût	Gratuit avec la carte <i>RAMQ</i> valide	Gratuit avec la carte <i>RAMQ</i> valide
Informations supplémentaires	<ul style="list-style-type: none"> ○ Si désiré, installation du stérilet immédiatement après l'avortement. ○ La présence de votre accompagnant lors de l'intervention n'est pas permis. ○ Nécessaire d'être à jeun 6h avant l'intervention. ○ Le stérilet de cuivre est gratuit, des frais s'appliquent pour le stérilet avec hormone. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Si désiré, le stérilet sera installé lors de la visite de suivi. ○ Intervention chirurgicale dans 5% des cas si avortement incomplet. ○ Il n'est pas nécessaire d'être à jeun avant les deux étapes du processus. ○ Des frais s'appliquent pour le stérilet de cuivre et avec hormone.