

Titre	INITIER LE MÉTRONIDAZOLE (FLAGYL) POUR LE TRAITEMENT DE LA VAGINOSE BACTÉRIENNE		CSFM-OC11
Référence à un protocole : Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>	Date d'entrée en vigueur : 01-01-2014	Date de révision : 29-03-2019	
Secteurs d'activités visés	Service clinique.		
Professionnels visés	<ul style="list-style-type: none"> • Les infirmières habilitées qui possèdent les connaissances et les compétences nécessaires et qui exercent au CSFM; • Les pharmaciens communautaires exerçant leur profession sur le territoire du Québec. 		
Exigences professionnelles	Aucune		
Clientèle visée	Femme de 14 ans et plus, ayant : <ul style="list-style-type: none"> • un test de KOH positif en pré-IVG; • un test de KOH positif en pré-stérilet; • un résultat de culture vaginale avec clues cells positif. 		
Activité(s) réservée(s) de l'infirmière	<ul style="list-style-type: none"> • Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique; • Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance. 		
Activité (s) réservée (s) au pharmacien communautaire	<ul style="list-style-type: none"> • Initier la thérapie médicamenteuse, selon une ordonnance; • Surveiller la thérapie médicamenteuse. 		
Médecin répondant	Dr. Jean-Victor Guimond		Dr Jean-Philippe Blais

Indications et conditions d'initiation

Traitement des infections provoquées par des micro-organismes anaérobiques comme la vaginose bactérienne.

Contre-indications

- Femme âgée de moins de 14 ans : se référer au Code civil du Québec, art. 14;
- Allergie ou intolérance au métronidazole (voir marche à suivre dans la section *Directives de l'infirmière*);
- Problème d'épilepsie;
- Antécédent de troubles sanguins;
- Problème hépatique;
- Fibrillation auriculaire.

NB. : Pas de contre-indications allaitement et grossesse.

Interactions

Le métronidazole augmente les effets des anticoagulants oraux (risque d'hémorragie), cause des problèmes gastro-intestinaux avec la consommation d'alcool et risque d'augmenter l'effet du lithium (danger de toxicité).

Effets secondaires

- Goût amer et arrière-goût *métallique*;
- Urine plus foncée;
- Céphalée;
- Étourdissements;
- Nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales, anorexie;
- Vaginite;
- Le métronidazole avec consommation d'alcool peut provoquer un effet antabuse : flush facial, vasodilatation périphérique intense, sueurs abondantes, nausées, vertiges, tachycardie avec hypertension.

Limites / orientation vers le médecin


- Femme présentant des vomissements suite à la prise du métronidazole et ne pouvant respecter la posologie adéquatement;
- Femme présentant plusieurs symptômes d'infection autre que des pertes vaginales abondantes blanches avec odeur de *poisson*, aviser le médecin traitant et suivre les recommandations.

Directives de l'infirmière

- Signer et remettre à la femme le formulaire de liaison *Initier le Métronidazole (Flagyl) pour le traitement de la vaginose bactérienne* pour l'application de l'ordonnance collective à l'intention du pharmacien (Fiche de liaison 1). Garder une copie au dossier;
- À la réception du formulaire de liaison, le pharmacien doit s'assurer qu'il s'applique à une ordonnance collective en vigueur qu'il détient;
- Posologie : Métronidazole 500 mg 1 co PO BID x 7 jours;
- Si contre-indications au métronidazole, remettre le formulaire de liaison *Initier la Clindamycine (Dalacin), si contre-indications au métronidazole pour traitement de la vaginose bactérienne* (Fiche de liaison 2). Garder une copie au dossier ;
- Informer des effets secondaires, de l'effet antabuse lors de la consommation d'alcool. Aviser de ne doit pas consommer d'alcool sous quelque forme que ce soit durant le traitement et 24 h après;
- Aviser de l'importance de poursuivre le traitement complet;
- Faire l'enseignement sur la vaginose bactérienne;
- Aviser de prendre les comprimés en mangeant, car peuvent irriter l'estomac.

Source

Vigilance santé, *Métronidazole*, version avril 2017.

Processus d'élaboration et d'approbation	
Rédigée par: Katherine Pellerin - Infirmière - Responsable des soins infirmiers	26-03-2019
Personnes consultés : Jean-Victor Guimond – Médecin	26-03-2019
Jean-Philippe Blais – Médecin	26-03-2019
Validé par : Jean-Victor Guimond – Médecin	28-03-2019
Jean-Philippe Blais – Médecin	29-03-2019
Approuvée par:  <hr/> Dr. Jean-Victor Guimond	28-03-2019
<hr/> Dr. Jean-Philippe Blais	29-03-2019