

Nous offrons deux méthodes d'interruption de grossesse. Voici un tableau comparatif pour vous aider à choisir laquelle vous convient le mieux. Sachez qu'il est possible que vous ne soyez pas éligible à l'une ou l'autre des deux méthodes pour diverses raisons.

Caractéristiques	Avortement par instruments	Avortement par médicaments
Nombre de semaines de grossesse pour effectuer l'avortement au Centre de santé des femmes de la Mauricie (CSFM)	Entre la 5 ^{ème} et la 14 ^{ème} semaine de grossesse selon l'échographie.	De la 5 ^{ème} jusqu'à la 10 ^{ème} semaine de grossesse selon l'échographie.
Lieu de l'avortement	Au CSFM	À votre domicile
Nombre de rendez-vous requis	Minimum 2 visites obligatoires ¹ . La 1 ^{ère} pour la rencontre préparatoire et une 2 ^{ème} pour l'intervention.	Minimum 4 rendez-vous obligatoires ¹ . Le 1 ^{er} pour la rencontre préparatoire (en présence), le 2 ^{ème} pour la prescription des comprimés (en présence ou en virtuel), le 3 ^{ème} pour le suivi (en virtuel), le 4 ^{ème} pour la confirmation de l'avortement complet (en virtuel).
Technique de l'avortement	Dilatation, aspiration et curetage	Prise de 2 types de médicaments qui forment le Mifégymiso ^{MD} <ul style="list-style-type: none"> ○ 1 comprimé de mifépristone ○ 4 comprimés de misoprostol pris 24 à 48 heures suivant la prise de la mifépristone².
Temps nécessaire pour effectuer l'interruption de grossesse	L'intervention dure en moyenne dix minutes.	Dans 98% des cas, l'expulsion survient dans les 8 heures suivant la prise du misoprostol (2 ^{ème} médicament)
Pourcentage de réussite	Très efficace (> 99%)	Très efficace (97,4%)
Possibilité de douleurs abdominales	Douleurs légères à modérées pendant l'intervention.	Douleurs modérées à sévères pendant l'expulsion.
Méthodes offertes pour soulager la douleur	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sédation consciente induite par deux médicaments intraveineux. ○ Anti-inflammatoire intra-veineux ○ Anesthésie locale du col de l'utérus. 	Analgésiques et anti-inflammatoire à prendre par voie orale à domicile.
Effets indésirables de la médication	Possibilité de nausées, vomissements, chute de pression artérielle, somnolence et difficulté respiratoire.	Possibilité de nausées, vomissements, diarrhées, fièvre, maux de tête et frissons.
Saignements	Certaines femmes n'ont aucun saignement, d'autres en ont des légers à modérés durant une période allant jusqu'à 3 semaines.	Il y aura des saignements de modérés à sévères au début, puis légers par la suite, durant une période allant jusqu'à 2 semaines et parfois davantage.

Caractéristiques	Avortement par instruments	Avortement par médicaments
Complications possibles	Elles sont rares mais possibles incluant : allergie médicamenteuse, avortement incomplet, poursuite de la grossesse, infection de l'utérus, hémorragie, risque d'infertilité, décès ³ .	
	Dépression respiratoire, perforation de l'utérus, hystérectomie totale ou partielle.	Embryotoxicité, rupture d'une grossesse ectopique non détectée, syndrome du choc toxique.
Accompagnement requis	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pour le retour à domicile. ○ Il est interdit de conduire durant 24h dû à la médication reçue. Vous serez considérée en facultés affaiblies. 	Il est fortement recommandé qu'une personne soit présente avec vous à la maison pour vous offrir du soutien en cas de besoin.
Jours de congé travail/école accordés	Le jour de l'intervention et les deux journées suivantes.	Le jour de la prise du <i>misoprostol</i> et la journée suivante.
Coût	Gratuit avec la carte RAMQ valide	Gratuit avec la carte RAMQ valide
Contraception	Si désiré, une contraception pourra vous être prescrite.	
Informations supplémentaires	<ul style="list-style-type: none"> ○ La présence de votre accompagnant lors de l'intervention n'est pas permis. ○ Nécessaire d'être à jeun 3h avant l'intervention. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Reprise de <i>misoprostol</i> ou avortement chirurgical dans 1-8% des cas si avortement incomplet. ○ Il n'est pas nécessaire d'être à jeun avant les deux étapes du processus

1. Selon l'évaluation clinique, d'autres rendez-vous pourraient être nécessaires.
2. 4 comprimés supplémentaires de misoprostol vous seront prescrits, à prendre selon les indications médicales, 4 heures après la prise des 4 premiers comprimés de misoprostol.
3. Le risque de décès est quasiment nul et nous mettons tout en œuvre pour qu'un tel évènement ne se produise pas. Les causes de décès peuvent être multiples telles que : rupture d'une grossesse ectopique non diagnostiquée, trouble grave de la coagulation non diagnostiqué, réactions allergiques graves, choc toxique ou autre problème de santé non déclaré.